

Šupinovka Nameko

(Pholiotanameko)

Drevokazná huba pôvodom z oblasti Juhovýchodnej Ázii je hojne pestovaná v Číne, Vietname, Kórei a Japonsku. Rastie v trsoch, má oranžovo hnedé zafarbenie klobúkov a na povrchu klobúkov, najmä mladších plodníc, sa vytvára vrstva slizu. Šupinovka Nameko patrí medzi významné pestované druhy. Je obľúbená a cenená pre jemnú chuť a trochu slizkú konzistenciu, ktorá sa počas varenia stráca.

Význam pestovania

Plodnice šupinovky majú vynikajúcu chuť. Hodia sa pod mäso, do polievok alebo do čínskych pokrmov.

Pestovanie na dreve

Potreby na pestovanie

Zrnitá sadba, čerstvo vyrúbané kmene listnatých stromov, plastové vrece, štepársky vosk.

Pestovateľský postup

Čerstvé kmene o priemere 10 cm narežeme na dĺžku 1 meter. Do kmeňov vyvrtáme otvory s priemerom 10-15 mm a hĺbke 20 mm vo vzdialenosti asi 150 mm od seba. Otvory vyplníme zrnitou sadbou a uzavrieme voskom. Kmene uložíme do vriec alebo ich obalíme fóliou, ktorú na niekoľkých miestach prepichnete. Kmene uložíme prerastať podhubím do teploty asi 20 C. Podhubím prerastú podľa tvrdosti dreva za 3-4 mesiace. Prerastené kmene položíme na tienisté vlhké miesto vonku. V čase sucha kmene kropíme. Plodnice sa tvoria na jar alebo na jeseň pri teplotách 5 až 15 °C. Klobúčiky šupinovky často vlhčíme, nesmú oschnúť.

Pestovanie na pilinách

Potreby na pestovanie

Piliny z listnatých stromov (nevadí menšia prímes ihličnanov), varné sáčky - napr. na tlačenu.

Pestovateľský postup

Piliny je nutné tepelne ošetriť - sterilizovať varom. Vlhké piliny naplníme do varného sáčku a ľahko zaviažeme motúzom. Sáčky postavíme do hrnca s úväzkami nahor a zalejeme vodou, aby úväzky boli nad vodou. Sáčky varíme asi 1 hodinu. Po vychladnutí sáčky očkujeme sadbou tak, že v čistej miestnosti sáčok otvoríme a vopred vyvareným držadlom varešky urobíme do pilín v sáčku otvor až na dno. Do neho nasypeme rozdrobenú sadbu a sáčok zaviažeme cez vatový valček, aby naočkovaný substrát mohol dýchať. Položíme ho prerastať do teploty asi 20 C. Po troch týždňoch substrát v sáčkoch prerastie podhubím. Sáčky postavíme a v úväzku odstránime hore časť sáčku. Sáčky je lepšie hore odrezat', až keď narastú malé plodnice. Plodnice potrebujú k vývoju svetlo a teplotu 5 až 15 °C. Je nutná vysoká vzdušná vlhkosť, preto sáčky dáme na tácku s tkaninou, ktorú udržujeme vlhkú. Plodničky rosíme postrekovačom.